

## Festuca cinerea

### Beschreibung

**Name:** Festuca cinerea


**Familie:** Poaceae

**Sorten:** Kitty Dark Blue und Eisvogel

### Verwendung

**Verwendung:** Beetpflanze, Mischcontainer, Sommer-/Herbstverkauf

**Sonneneinstrahlung:** Volle Sonne, teilweise Schattierung



### Kulturanleitung

**Topftermin/Pflanzen pro m2:** Empfohlene Topfgröße 9-13 cm. Die Kulturzeit beträgt etwa 10-13 Wochen. Die Belegung pro m2 entspricht der Topfgröße (bei einem 12 cm Topf etwa 25-32 Pflanzen/m2). Bewurzelte Stecklinge sollten so gepflanzt werden, dass sich die Oberseite des Bewurzelungsmediums auf Höhe des Substrats oder knapp darunter befindet, um Krankheitsrisiken zu vermeiden. In südlichen Klimazonen ist die Freilandkultur bei frostfreien Bedingungen möglich.

**Substrat:** Verwenden Sie ein gut durchlässiges, strukturstabiles, steriles Substrat mit einem pH-Wert von 6,0-6,5. Zur Grunddüngung sollten 1-1,5 g/l Mehrnährstoffdünger im Substrat enthalten sein.

**Düngung:** Mittelstarke Düngung. Nutzen Sie einen ausgeglichenen NPK-Dünger 3-1-5 mit Ca, Mg und Spurenelementen im Verhältnis 0,7-0,9 g/l bei jeder Wassergabe mit ausgewogenen Nährstoffkomponenten.

**Temperatur:** Halten Sie die ersten 2-3 Wochen eine Temperatur > 15°C ein, bis die Pflanzen gut angewachsen sind. Dann sollte die Mindesttemperatur bei > 8°C liegen. Die Freilandkultur ist bei frostfreien Bedingungen möglich. Das Blattwerk kann in heißen, feuchten Sommern erheblich abnehmen.

**Wasser:** Halten Sie das Substrat (mittel-) feucht. Das Substrat niemals austrocknen lassen, um braune Blattspitzen zu vermeiden.

**Belichtung:** Volles Licht. Toleriert leichte Schattierung, aber beste Blattfarbe bei voller Sonneneinstrahlung.

**Wachstumsregulierung:** Nicht erforderlich.

**Stutzen:** Nicht erforderlich.

**Schädlinge und Krankheiten:** Spinnmilben sind die häufigsten Schädlinge bei Festuca. Starten Sie mit sauberem Material, gut desinfiziertem Zubehör sowie einem angemessenen Pflanzenschutzprogramm mit verschiedenen Kontrollstrategien: Exklusion, Überwachung, biologischer und chemischer Pflanzenschutz sind die besten Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Schädlinge.

Festuca kann anfällig für Botrytis und Wurzelfäule sein. Die Gesunderhaltung sollte durch Hygienekonzepte, Kontrolle der Umgebungsbedingungen sowie biologischen und chemischen Pflanzenschutz erfolgen.

Befolgen Sie beim chemischen Pflanzenschutz die Bestimmungen der einzelnen Produkte in den jeweiligen Regionen.

## Kulturplan \* 12 cm Topf

Woche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Vorfrühlingskultur	T:														F	F
Frühlings- /Sommerkultur	T:												F	F		

T: Topfen F: Fertigpflanze

\*Dieser Zeitplan ist nur ein Richtwert, der je nach Sorte, Anbaubedingungen und Region variieren kann. Start des Zeitplans ab bewurzelttem Steckling

**HINWEIS:** Die dargestellten Informationen sollten nur als Richtlinie dienen. Selecta One empfiehlt einen Test der Produkte unter eigenen Bedingungen. Die Kulturzeiten variieren je nach Klima, Standort, Jahreszeit und Gewächshausbedingungen. Es liegt in der Verantwortung des Produzenten, die aktuellen Anweisungen für die Produkte auf dem Etikett zu lesen und zu befolgen. Nichts in diesem Dokument gilt als Gewährleistung oder Garantie von Selecta One für die hier aufgeführten Produkte.